

228.	Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza	Fino a 6	
229.	Esiti di frattura d'omero diafisaria, viziosamente consolidata, con dismorfismo, in assenza o con sfumata compromissione funzionale	Fino a 4	
230.	Anchoriosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera	d. 18	n.d. ⁹ 15
231.	Anchoriosi del gomito in posizione sfavorevole	d. 24	n.d. ⁹ 20
232.	Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità	Fino a 5	
233.	Perdita totale dell'avambraccio, a seconda dell'applicazione di protesi efficace	d. 50-55	n.d. ⁹ 40-45
234.	Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale	Fino a 4	
235.	Esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale	Fino a 4	
236.	Anchoriosi del polso in estensione rettilinea, in supinazione	d. 20	n.d. ⁹ 16
237.	Anchoriosi del polso in estensione rettilinea, senza limitazione della pronosupinazione	d. 10	n.d. ⁹ 8
238.	Movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi	2	
239.	Perdita bilaterale della mano	75	
240.	Perdita della mano	d. 55	n.d. ⁹ 45
241.	Perdita di tutte le dita della mano	d. 48	n.d. ⁹ 41
242.	Perdita del pollice e del I metacarpo	d. 22	n.d. ⁹ 18